










When Should I Keep My Student Home?

NOTE: These are school instructions, not medical advice. Please contact your doctor with health concerns.

The list below tells the shortest time to stay home.










Your student may need to stay home longer for some illnesses.

Student's Symptoms or Illness	Student May Return to School When*
 Fever: temperature by mouth 100.4 degrees or greater, or chills	Stay home for at least 10 days per COVID-19 exclusion guidelines. They must be fever-free for at least 24 hours without the use of fever-reducing medicine and symptoms are improving.
 New or worsening cough , shortness of breath , or difficulty breathing , or new loss of taste or smell	Stay home for at least 10 days per COVID-19 exclusion guidelines. They must be fever-free for at least 24 hours without the use of fever-reducing medicine and symptoms must be improving.
 New cough illness (pertussis)	If pertussis (whooping cough) is diagnosed, after taking a 5-day course of prescribed antibiotics, or when cleared for return by local public health authority. Must provide a doctor's note.
 Skin rash or open sores	Rash is gone; sores are dry or can be completely covered by a bandage; or with orders from doctor to school nurse.
 Diarrhea: 3 loose or watery stools in one day OR newly not able to control bowel movements	Symptom-free for 48 hours.
 Vomiting	Symptom-free for 48 hours.
 Headache with stiff neck and fever; OR with recent head injury	Fever-free for 24 hours; symptom-free; or with orders from doctor to school nurse.
 Jaundice: (new) yellow color in eyes or skin	After orders from doctor or local public health authority to school nurse.
 Red eyes or eye discharge: yellow or brown drainage from eyes	Redness and discharge is gone OR with orders from doctor to school nurse.
Acting different without a reason: unusually sleepy or grumpy OR acting differently after a head injury	After return to normal behavior OR with orders from doctor to school nurse.
Major health event , like surgery OR an illness lasting 2 or more weeks	After orders from doctor to school nurse.
Student's health condition requires more care than school staff can safely provide	After measures are in place for student's safety.

¿Cuándo debo dejar a mi estudiante en la casa?

NOTA: Estas son instrucciones escolares, no consejos médicos. Comuníquese con su médico si tiene problemas de salud. La siguiente lista indica el tiempo más corto para quedarse en casa.

Es posible que su estudiante necesite quedarse en casa más tiempo por algunas enfermedades.

Síntomas o enfermedad del estudiante	El estudiante regresará a la escuela cuando*
 Fiebre: temperatura tomada por la boca de 100.4 grados o más, o escalofríos	Quédese en casa durante al menos 10 días según las pautas de exclusión de COVID-19. Deben estar libres de fiebre durante al menos 24 horas sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre y los síntomas están mejorando.
 Tos reciente o que empeora, falta de aire o dificultad para respirar, o reciente pérdida del sentido del gusto o del olfato.	Quédese en casa durante al menos 10 días según las pautas de exclusión de COVID-19. Deben estar libres de fiebre durante al menos 24 horas sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre y los síntomas están mejorando.
 Tos reciente enfermedad de tos ferina (tos convulsiva)	Si se diagnostica tos convulsiva (tos ferina), después de tomar un ciclo de 5 días de antibióticos recetados o cuando la autoridad de salud pública local autoriza su regreso. Debe proporcionar una nota del médico.
 Erupción cutánea o llagas abiertas	La erupción ha desaparecido; las llagas están secas o pueden cubrirse completamente con un vendaje; o con órdenes del médico a la enfermera de la escuela.
 Diarrea: 3 deposiciones blandas o acuosas en un día O recientemente no puede controlar las deposiciones.	Sin síntomas durante 48 horas.
 Vomito	Sin síntomas durante 48 horas.
 Dolor de cabeza con rigidez en el cuello y fiebre; O con reciente lesión en la cabeza	Sin fiebre durante 24 horas; libre de síntomas; o con órdenes del médico a la enfermera de la escuela.
 Ictericia: (reciente) color amarillo en ojos o piel	Después de las órdenes del médico o la autoridad de salud pública local a la enfermera de la escuela.
 Ojos rojos o secreción ocular: secreción amarilla o marrón de los ojos	El enrojecimiento y la secreción desaparecieron O con órdenes del médico a la enfermera de la escuela.
Actuar diferente sin una razón: inusualmente somnoliento o de mal humor O actuar de manera diferente después de una lesión en la cabeza	Después de regresar al comportamiento normal O con órdenes del médico a la enfermera de la escuela.
Evento de salud importante, como una cirugía O una enfermedad que dure 2 semanas o más	Después de las órdenes del médico a la enfermera de la escuela.
La condición de salud del estudiante requiere más atención de la que el personal escolar puede brindar de manera segura	Después de que se tomen medidas para la seguridad del estudiante.